


ALGORITMOS DIAGNÓSTICOS Y/O TERAPÉUTICOS

FICHA Nº 2

Dra. Silvia I. Falasco

ALGORITMO DIAGNÓSTICO DE MONOARTRITIS AGUDA



ALGORITMOS DIAGNÓSTICOS Y/O TERAPÉUTICOS

FICHA Nº 2

Dra. Silvia I. Falasco

ALGORITMO DIAGNÓSTICO DE MONOARTRITIS AGUDA

LS: Líquido sinovial; HC: hemocultivos

*En Artritis Reumatoidea puede encontrarse en LS cristales de colesterol, aumento de $\beta 2$ microglobulina, ferritina y Zn.

Independientemente del número de leucocitos si los PMN son mayores al 90% sospechar artritis séptica.

BIBLIOGRAFÍA

- 1- Martínez-Castillo Araceli, Núñez Carlos, Cabiedes Javier. Análisis de líquido sinovial. Reumatol Clin. 2010; 06: 316-21.
- 2- Trejo Cecilia. Diagnóstico Diferencial de Monoartritis. Reumatología 2005; 21(4):222-225.
- 3- Martínez María Eugenia. Diagnóstico Diferencial Monoartritis y Poliartritis. Departamento de Reumatología. Pontificia Universidad Católica de Chile. <http://escuela.med.puc.cl/publ/ApuntesReumatologia/DiagnosticoDiferencial.html#>
- 4- Padrós Soler G, Galán Ortega A, Guillén Campuzano E, Hortas Nieto ML, Marín Soria JL, Muñoz Pérez JM y Noguera Bennaser A. Recomendaciones para el estudio del líquido sinovial. Química Clínica 2004; 23 (6) 434-438.