



# ALGORITMO DIAGNÓSTICO DE HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA (HDB)

FICHA Nº 2

Dra. Falasco Silvia Iris



Tto: tratamiento



En HIDB aguda primero estabilizar hemodinámicamente al paciente.  
 Evaluar características del sangrado, síntomas asociados y antecedentes.  
 Para realizar la colonoscopia administrar una pompa oral rápida con una solución salina estabilizada osmóticamente con polietilenglicol (no hay evidencia de que la limpieza intestinal sume o restee el sangrado).  
 La Angiografía requiere un sangrado  $\geq$  a 0.3 ml/min para ser positiva en hemorragia arterial.  
 Los Estudios isotópicos permiten detectar sangrados de 0.1 ml/día.

## BIBLIOGRAFÍA.

- 1-Garrido Botella, Rincón Fuentes JP, Martínez Porras. Hemorragia Digestiva Baja. *Medicine* 2001 ;4: 143-151.
- 2-Miño Fugarolas G y González Galilea A. Hemorragia Digestiva Baja. Sección III. Intestino Delgado. En Tratamiento de las Enfermedades Gastroenterológicas. Asociación Española de Gastroenterología. <http://www.aegastro.es/publicaciones/libros/presentación.htm>
- 3-American Gastroenterological Association medical position statement: Evaluation and management of occult and obscure gastrointestinal bleeding. *Gastroenterology* 2000; 118:197-201.